




Banebrydende ernæring til håndtering af thyreoidea sundhed



Dyrlæger i klinisk studie bekræfter virkningen af y/d™

I et klinisk studie anvendte dyrlæger Prescription Diet™ y/d™ til 221 katte i 10 europæiske lande for at måle virkningen af y/d™. Resultaterne* var enestående.



- ✓ Plasmaniveauerne af thyreoideahormon lå inden for referenceintervallet i størstedelen af tilfældene efter 8 uger
- ✓ Sværhedsgraden af polyfagi, hyperaktivitet og andre tegn faldt
- ✓ Den generelle livskvalitet blev forbedret i løbet af studiet

Specialister hilser den nye ernæringsløsning velkommen:



"Ifølge min erfaring reagerer katte på y/d™ inden for 4 uger og bliver euthyroide på 8 uger. Kattene bliver mere harmoniske, mindre stressede og går op i vægt. Klienterne er glade for, at de kan håndtere deres katte uden at skulle give piller. Det har vist sig, at være en fordel at anvende y/d™ til de patienter hvor man har haft problemer med at finde en velfungerende dosis med piller. Det bedste ved y/d™ er, at det er så enkelt. Det er let at fodre med, og det er et godt alternativ til katte, som har samtidige sygdomme, som gør, at man ikke kan behandle med piller eller jod. Jeg bliver ved med at anbefale y/d™ til mine patienter."

Lina Ruda, Klinikdyrlæge, Blåstjärnans Djursjukhus, Sverige.

Læs flere udtalelser fra andre specialister på www.hillsvet.dk

* Resultater af klinisk studie med Prescription Diet™ y/d™ udført i Europa, januar-juli 2012.

** Ifølge registrering på rangskala. Vist som middelværdi. 0 uger: n=221; 4 uger: n=92; 8 uger: n=73.

Hill's™ Prescription Diet™ y/d™: Lige så nemt som at fodre

Tips til succesfuld overgang for katte til y/d™



Oplys katteejere om ændring af appetit

- Hyperthyreoide katte kan have polyfagi. Når de bliver euthyreoide, aftager polyfagien, hvilket kan være et tegn på restitution.
- Hyperthyreoide katte kan også være anorektiske på grund af samtidig sygdom, høj alder, medicineringer m.v. Vi anbefaler tæt monitorering af disse tilfælde for at sikre korrekt overgang til det nye foder.



Husholdninger med flere katte

- Til husholdninger med flere katte anbefaler vi, at sunde og syge katte fodres på forskellige tidspunkter og på forskellige steder i hjemmet, samt at foderet opbevares korrekt.
- Raske katte, der spiser y/d™, skal yderligere have mindst 1 spiseskefuld vedligeholdelsesfoder pr. dag.



Indendørs-/udendørskatte

- Udelivet kan påvirke virkningen. Vi anbefaler derfor tæt monitorering af disse tilfælde.




Tilbyd varieret fodring

- Blanding af y/d™ våd- og tørfoder fremmer compliance.



Tillad en passende overgangsperiode

- Vi anbefaler, at y/d™ introduceres gradvis over en 7-dages periode, som vist nedenfor.
- Patienter på antithyreoid medicin skal helt ophøre med medicinen, inden de overgår til y/d™.



Efter overgangen skal der kun gives y/d™ som ernæringskilde



Foderpillerne er vist i naturlig størrelse.
Farven kan variere fra fotoet.



Klinisk ernæring der forbedrer livskvaliteten™